

احتیاط های مبتنی بر راه انتقال بیماری

نوع احتیاط	بیماری	احتیاطات مورد نیاز
احتیاط هوایی (Airborne Precautions)	سل ریه یا حنجره	✓ بستری بیمار در اتاق خصوصی با فشار منفی و تعویض هوا حداقل ۱۲ بار در ساعت
	سرخک	✓ بستن درب اتاق بیمار
	منزیت سلی در صورت وجود ارنشاخ ریوی	✓ خروج های اتاق بیمار مستقیم به فضای بیرون و در صورت عدم امکان استفاده از فیلتر هپا قبل از برگشت هوا به سیستم تهویه عمومی
	زونای منتشر	✓ استفاده از ماسک N95 زمان ورود به اتاق بیمار
	آبله مرغان	✓ محدود کردن جابجایی بیمار و در صورت نیاز به جابجایی استفاده بیمار از ماسک جراحی
	آبله میمونی	
	آنفلوآنزای پرنده‌گان	
احتیاط قطره‌ای (Droplet Precautions)	آنفلوآنزا	✓ بستری بیمار در اتاق خصوصی (در صورت وجود چند بیمار با یک بیماری خاص، می‌توان آنها را در یک اتاق بستری نمود)
	منزیت	✓ در صورت بستری بیماران با عفونت غیر مشابه جداسازی فیزیکی فضا بین تخت‌ها با رعایت فاصله حداقل یک متر از طریق کشیدن پرده بین آنها
	پنومونی	✓ استفاده از ماسک جراحی زمان ورود به اتاق بیمار در صورت تماس نزدیک با بیمار دچار عفونت
	اوریون	✓ استفاده از ماسک جراحی توسط بیمار زمان انتقال و جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله
	سیاه سرفه	✓ استفاده از گان و دستکش تابع اصول احتیاط‌های استاندارد است.
	طاعون	
	دیفتری حلقی	
	سرخجه	
	مخملک	
	کووید-۱۹	
	تب خونریزی دهنده ویروسی (تب کریمه کنگو)	
	آنفلوآنزای پرنده‌گان	
	سندرم تنفسی شدید حاد (SARS)	
احتیاط تماسی (Contact Precautions)	بیماری‌های اسهالی	✓ بستری بیمار در اتاق خصوصی (یا بستری چند بیمار با عفونت یکسان در یک اتاق، در صورت نبودن اتاق کافی)
	E و هپاتیت	✓ در صورت بستری بیماران با عفونت غیر مشابه جداسازی فیزیکی فضا بین تخت‌ها با رعایت فاصله حداقل بیش از یک متر بین تخت‌های بیماران پوشیدن دستکش در زمان احتمال تماس با پوست سالم بیمار، سطوح و وسایل نزدیک بیمار مانند محافظت تخت و پرونده بیمار در آوردن دستکش قبل از ترک اتاق
	گاستروآنتریت	✓ بهداشت دست بلا فاصله پس از درآوردن دستکش
	کوتزکتیوبیت حاد ویروسی	✓ استفاده از گان در صورت احتمال تماس با مواد بالقوه عفونی بیمار تماس لباس پرستنل با بیمار یا محیط پیرامون بیمار در آوردن گان قبل از ترک اتاق ایزوله
	سرخجه مادرزادی	✓ محدود کردن حرکت و جابجایی بیمار به موارد کاملاً ضروری
	گال و شپش	✓ نظافت و گندزدایی وسایل مراقبت از بیمار، وسایل کنار تخت بیمار و سطوح در تماس مکرر حداقل روزی یکبار
	آبسه در حال ترشح	✓ ترجیحاً وسایل غیربخارانی مراقبت از بیمار مانند گوشی و فشارسنج در اتاق ایزوله بماند و عدم استفاده برای سایر بیماران
	تب خونریزی دهنده ویروسی (تب کریمه کنگو)	
	زونای منتشر	
	آبله مرغان	
	آبله میمونی	
	آنفلوآنزای پرنده‌گان	
	سندرم تنفسی شدید حاد (SARS)	