


عمل تزریق گاز در چشم

رعایت موارد زیر جهت بعد از انجام عمل تزریق گاز در چشم الزامی می باشد:

- ۱ - در روزهای تعیین شده جهت پیگیری و ادامه درمان به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
- ۲ - بهتر است تا ۲۴ ساعت پس از تزریق گاز، از شستشوی صورت و حمام کردن با نظر پزشک معالج خود خودداری نمایید.
- ۳ - از خم و راست شدن و حرکات سریع که به چشمtan آسیب می رساند پرهیز نمایید.
- ۴ - طریقه خوابیدن و وضعیت قرار گرفتن سر را از پزشک خود سوال نمایید.
- ۵ - در بعضی بیماران لازم است بیمار به دست راست یا چپ و یا در وضعیت خوابیده به شکم استراحت نمایید.
- ۶ - مطالعه و تماشای تلویزیون و فعالیت های عادی زندگی به شرطی که سر در وضعیت صحیحی قرار بگیرد منع ندارد.
- ۷ - در صورت تزریق گاز در چشم، در خصوص مسافت با اتومبیل و قطار با توجه به نظر پزشک معالج خود اقدام شود.
- ۸ - از مسافت هواپی حتماً اجتناب کنید.
- ۹ - معمولاً با توجه به دستور پزشک معالج خود، نیازی به پانسون و مصرف داروی خاصی نمی باشد.

- ۱۰ - در صورت بروز علایمی مانند خونریزی شدید، درد چشم، قرمزی شدید، حساسیت به نور، کاهش دید و ترشح چرکی فوراً به اورژانس چشم یا پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
- ۱۱ - بعد از تزریق گاز معمولاً حبابی به شکل سیاه رنگ متحرک در قسمتی از دید شما به وجود می‌آید لذا از این علامت ترسید.
- ۱۲ - این راهنمای اطلاعات آموزشی مختصری در اختیارتان می‌گذارد، پیگیری جهت درمان، مراقبت و آموزش ضروری می‌باشد.



کد محتوا: E/25

نشانی: اصفهان - میدان قدس ابتدای خیابان مدرس مرکز آموزشی درمانی فیض - تلفن ۸ - ۰۳۱۱۰۶۷۷۴۳ - وеб سایت: felz.mui.ac.ir - منابع هرستاری داخلی و جراحی برونز و سودارت. چشم - وеб سایت های مورد تأیید چشم ویراش: فروردین ۱۴۰۲