


# عمل شالازیون

رعاایت موادرد زیر جهت بعد از عمل شالازیون الزامی می باشد:

- ۱ - در انجام فعالیت های روزانه زندگی منعی وجود ندارد.
- ۲ - ۵ تا ۶ ساعت بعد از عمل بهتر است، پانسمان بروی چشمندان باشد.
- ۳ - در صورت بروز خونریزی مجدد از پانسمان فشاری جهت کنترل آن استفاده نمایید.
- ۴ - بعد از باز کردن پانسمان، چشم خود را با آب ولرم و شامپوی تجویز شده توسط پزشک معالج خود بشوئید.
- ۵ - بعد از باز کردن پانسمان چشم دیگر نیازی به پانسمان مجدد چشمندان نمی باشد.
- ۶ - بهتر است تا یک ماه بعد از عمل جهت پیشگیری از عود مجدد آن، در طول روز، چشم خود را با آب ولرم و شامپوی تجویز شده توسط پزشک معالج خود بشوئید.
- ۷ - استفاده از کمپرس سرد ۲۴ ساعت پس از عمل منعی ندارد.
- ۸ - خوردن مسکن خوارکی (استامینوفن) با نظر پزشک معالجتان منعی ندارد.
- ۹ - در روزهای تعیین شده جهت معاينه چشم، به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
- ۱۰ - از قطره ها و پماد چشمی خود طبق نظر پزشک معالج استفاده نمایید.
- ۱۱ - در صورتی که بیش از یک نوع قطره تجویز شده، حداقل ۵ دقیقه فاصله هنگام ریختن قطره های چشمی را رعایت نمایید.

- ۱۲- مدت زمان استفاده از قطره ها و پماد چشمی خود را از پزشک معالج سوال نمایید.
- ۱۳- از قطع خودسرانه داروهای خود، خودداری نمایید.
- ۱۴- در صورت بروز علایمی مانند خونریزی شدید، درد چشم، قرمزی شدید، حساسیت به نور، کاهش دید و ترشح چرکی فوراً به اورژانس چشم یا پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
- ۱۵- این راهنمای اطلاعات آموزشی مختصری در اختیارتان می‌گذارد، پیگیری جهت درمان، مراقبت و آموزش ضروری می‌باشد.



کد محتوا: E/24

نشانی: اصفهان - میدان قدس ابتدای خیابان مدرس مرکز آموزشی درمانی فیض - تلفن ۰۳۱-۰۱۱-۷۶۴۴۴۲-۰۳۱

وپ سایت: feiz.mui.ac.ir - منابع: بیرستاری داخلی و جراحی برونز و سودارت. چشم - وب سایت های مورد تائید چشم

ویراش: فروردین ۱۴۰۲