



عمل برداشت خایعه از پلک یا نمونه برداری از چشم

رعايت موادر زير جهت بعد از انجام عمل برداشت خایعه
از پلک یا نمونه برداری از چشم الزامي می باشد:

- ۱ - در انجام فعالیت های روزانه زندگی منع وجود ندارد.
- ۲ - مراقبت های لازم در خصوص پيشگيري از ضربه به چشم عمل شده را رعايت نمایيد.
- ۳ - خوردن مسكن خوراکی (استامینوفن) یا نظر پزشک معالجتان منع ندارد.
- ۴ - در روزهای تعیین شده جهت معاينه چشم به پزشک معالج خود مراجعه نمایيد.
- ۵ - از قطره ها و پماد چشمی خود طبق نظر پزشک معالج استفاده نمایيد.
- ۶ - در صورتی که بيش از يك نوع قطره تجويز شده حداقل ۵ دقيقه فاصله هنگام ريختن قطره های چشمی را رعايت نمایيد.
- ۷ - مدت زمان استفاده از قطره ها و پماد چشمی خود را ز پزشک معالج سوال نمایيد.
- ۸ - از قطع خودسرانه داروهای خود خودداری نمایيد.
- ۹ - پس از آماده شدن جواب نمونه برداری خود، حتما به پزشک معالج خود مراجعه نمایيد.

- ۱۰ - در صورت بروز علایمی مانند خونریزی شدید، درد چشم، قرمزی شدید، حساسیت به نور کاهش دید و ترشح چرکی فوراً به اورژانس چشم یا پزشک معالج خود مراجعه نمایید
- ۱۱ - معمولاً بعداز این عمل جراحی خونابه مختصری در پانسمان دیده می شود که اهمیت ندارد ولی خونریزی شدید غیر طبیعی است.
- ۱۲ - این راهنمای اطلاعات آموزشی مختصری در اختیاراتان می گذارد، پیگیری جهت درمان، مراقبت و آموزش ضروری می باشد.



کد محتوا E/27

نشانی: اصفهان - میدان قدس ابتدای خیابان مدرس مرکز آموزشی درمانی فیض - تلفن ۸-۳۲۴۵۲۰۳۱ و ۱۰-۱۱-۳۲۴۷۶۰۱ - وب سایت: feiz.mui.ac.ir - منابع: پرستاری داخلی و جراحی بروکر و سودارت. چشم - وب سایتهای مورد تائید چشم ویراوش: فروردین ۱۴۰۲