



# عمل اکتروپیون و آنتروپیون

**رعایت موارد زیر جهت بعداز عمل اکتروپیون و آنتروپیون الزامی می باشد:**

- ۱ - در انجام فعالیت های روزانه زندگی منعی وجود ندارد.
- ۲ - مراقبت های لازم در خصوص پیشگیری از ضربه به چشم عمل شده را رعایت نمایید.
- ۳ - خوردن مسکن خوراکی (استامینوفن) با نظر پزشک معالجتان منعی ندارد.
- ۴ - در روزهای تعیین شده جهت معاينه چشم، به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
- ۵ - از قطره ها و پماد چشمی خود طبق نظر پزشک معالج استفاده نمایید.
- ۶ - در صورتی که بیش از یک نوع قطره تجویز شده، حداقل ۵ دقیقه فاصله هنگام ریختن قطره های چشمی را رعایت نمایید.
- ۷ - مدت زمان استفاده از قطره ها و پماد چشمی خود را از پزشک معالج سوال نمایید.
- ۸ - از قطع خودسرانه داروهای خود، خودداری نمایید.
- ۹ - در صورت بروز علایمی مانند خونریزی شدید، درد چشم، قرمزی شدید، حساسیت به نور، کاهش دید و ترشح چرکی فوراً به اورژانس چشم یا پزشک معالج خود مراجعه نمایید.


۱۰- ماساژ پلک ها خصوصا در محل زخم جراحی باعث ایجاد مشکل در نتیجه جراحی می شود،  
از این کار پرهیز نمایید.

۱۱- مراقبت های لازم در خصوص پیشگیری از ضربه به چشم عمل شده را رعایت نمایید.

۱۲- این راهنمای اطلاعات آموزشی مختصری در اختیارتان می گذارد، پیگیری جهت درمان، مراقبت  
و آموزش ضروری می باشد.



انتروپیون چشم



چشم سالم



اکتروپیون چشم

کد محتوا: E/28

نشانی : اصفهان - میدان قدس ابتدای خیابان مدرس مرکز آموزشی درمانی فیض - تلفن ۸ - ۳۴۴۵۲۰۳۱ و ۱۰-۱۱ و ۳۴۴۷۶۰۱۰  
وب سایت: feiz.mui.ac.ir - منابع: پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارت. چشم - وب سایت های مورد تائید چشم  
ویراش : فروردین ۱۴۰۲