



تخلیه چشم



تخلیه چشم:

مهمترین علت تخلیه چشم ، چشم دردناک و بدون دید می باشد. درعمل جراحی، چشم و یا قسمتی از بافت چشم به همراه بخشی از عصب بینایی خارج می گردد.

مراقبت های بعد از عمل:

- بعد از عمل معمولاً یک پانسمان بزرگ فشاری روی ناحیه عمل قرارمی دهند.
- پانسمان فشاری معمولاً پس ازدوتاسه روز بعد از عمل برداشته می شود.(با نظر پزشک معالج)
- درصورت تخلیه کره چشم معمولاً پس ازعمل ازپروتز موقت مصنوعی(به نام کانفورمر) برای حفظ شکل ظاهری و پرشدن موضع استفاده می گردد.
- از داروهای چشمی تجویز شده بطور کامل استفاده نمایید.
- در صورتی که پروتز موقت (کانفورمر) به طور اتفاقی از حفره چشم بیرون افتاد بلافاصله پروتز شسته و خشک گردد و به حفره چشم برگردانده شود.(با نظر پزشک معالج)
- شستشوی کامل دست قبل از گذاشتن پروتز جهت پیشگیری از عفونت و آلودگی به چشم موثر است.
- زمان حمام کردن را از پزشک خود سوال کنید ولی یک تا دو هفته بعد از عمل از رسیدن آب به حفره چشم خودداری کنید.(بانظر پزشک معالج)

• مطالعه ، تماشای تلویزیون و فعالیت های عادی زندگی وهمچنین خوابیدن به سمت چشم عمل شده از روز بعد عمل بلامانع است.

• پس ازخارج کردن یک چشم حس عمق کاهش می یابد و بایستی در حرکات خود احتیاط بیشتری کنید تا در محاسبه ارتفاعات دچار اشتباه نشوید و سقوط ننمایید.

• حداقل یک ماه بعد ازعمل از انجام رانندگی خودداری کنید.

• جهت معاینات دوره ای به توصیه پزشک معالج توجه فرمایید.

• در صورت هرگونه ناراحتی غیرعادی، حساسیت و یا قرمزی کره چشم یا پلک به پزشک معالج یا اورژانس چشم پزشکی مراجعه نمایید.

• پس از اطمینان پزشک از بهبودی حفره کاسه چشم ، بیماررا به متخصص ساخت چشم مصنوعی ارجاع می دهد.

• چشم مصنوعی جهت بهبود زیبایی ظاهری شما می باشد.

• معمولاً دوره بهبودی پس از عمل حدود ۸- ۶ هفته طول می کشد.

• مصرف داروهای چشمی براساس دستور پزشک پس از عمل لازم است

• از مصرف ویا قطع خودسرانه داروها جدا خودداری کنید.

کد محتوا: ۳

نشانی : اصفهان - میدان قدس ابتدای خیابان مدرس مرکز آموزشی درمانی فیض - تلفن ۸ - ۳۴۴۵۲۰۳۱ و ۱۱-۳۴۴۷۶۰۱۰ وب سایت: feiz.mui.ac.ir - منابع :پرستاری داخلی و جراحی برونز و سودارث. چشم - وب سایت های مورد تأیید چشم پزشکی سال ۱۴۰۰