



# عمل تارسورافی


## رعايت موادر زير جهت بعد از انجام عمل تارسورافی الزامي می باشد:

- ۱ - در انجام فعالیت های روزانه زندگی منعی وجود ندارد.
- ۲ - مراقبت های لازم در خصوص پیشگیری از ضربه به چشم عمل شده را رعايت نمایید.
- ۳ - خوردن مسکن خوراکی (استامینوفن) با نظر پزشك معالجتان منعی ندارد.
- ۴ - در روزهای تعیین شده جهت معاينه چشم، به پزشك معالج خود مراجعه نمایید.
- ۵ - در روز تعیین شده جهت کشیدن بخیه چشم خود، به پزشك معالج خود مراجعه نمایید.
- ۶ - از پماد چشمی خود طبق نظر پزشك معالج استفاده نمایید.
- ۷ - در صورتی که بيش از يك نوع قطره تجويز شده، حداقل ۵ دقيقه فاصله هنگام ریختن قطره های چشمی را رعايت نمایید.
- ۸ - مدت زمان استفاده از قطره ها و پماد چشمی خود را از پزشك معالج سوال نمایید.
- ۹ - از قطع خودسرانه داروهای خود، خودداری نمایید.

۱۰ - در صورت بروز علایمی مانند خونریزی شدید، درد چشم، قرمزی شدید، حساسیت به نور، کاهش دید، ترشح چركی و باز شدن بخیه چشم فوراً به اورژانس چشم یا پزشک معالج خود مراجعه نمایید.

۱۱ - به هیچ عنوان تلاش نکنید که پلک ها را از هم باز نمایید زیرا در این عمل قسمتی از شکاف پلکی با جراحی بسته شده است.

۱۲ - این راهنمای اطلاعات آموزشی مختصری در اختیارتان می گذارد جهت درمان، مراقبت، آموزش ضروری است.



### E/29