



پیوند قرنيه



پیوند قرنيه:

پیوند قرنيه نوعی عمل جراحی است که طی آن قسمت آسیب دیده قرنيه ویا کل قرنيه بیمار برداشته شده و با یک قرنيه جدید و سالم جایگزین می گردد.

مراقبت های بعد از عمل:

- تاري دید بعد از عمل به تدریج و به آهستگی بهبود می یابد.
- درد ، حساسیت و اشک ریزش چشم معمولاً پس از ۴-۳ روز بهبود می یابد.
- در این عمل بافت دیر جوش می خورد تا چندین ماه فاقد حس است و پس از جوش خوردن نیز هرگز استحکام قرنيه عادی را ندارد لذا باید به شدت مراقب ضربه و فشار خارجی باشید.
- در هفته های اول پس از عمل حتماً از محافظ پلاستیکی قابل شستشو با آب و صابون استفاده کنید.
- در هفته های اول پس از عمل از زور زدن ، خم شدن ، مالیدن و خاراندن چشم و برداشتن اشیای سنگین خودداری کنید.
- نماز خواندن از همان روز عمل با تیمم (بانظر پزشک معالج) بلامانع است ، ولی تا وقتی پزشک دستور ندهد از سجده کردن خودداری شود و مهر با دست به پیشانی نزدیک گردد.
- در صورت وجود علائم ناراحتی و درد پایدار در چشم ، حساسیت به نور ، قرمزی و اشک ریزش چشم ، کاهش ویا تاري دید ، فوراً به پزشک معالج ویا اورژانس چشم مراجعه کنید.

- طرز مصرف صحیح داروها را از پزشک خود سوال کنید، مصرف صحیح و به موقع داروها پس از عمل در میزان موفقیت عمل تاثیر زیادی دارد.

در هنگام چکاندن قطره ها در چشم نکات زیر را رعایت نمایید:

- بهتر است قطره توسط فرد دیگری در چشم شما چکانده شود.
- دستها را قبل از چکاندن قطره با آب و صابون بشوید.
- در صورت نیاز ابتدا مژه ها و پلکها را با پنبه از گوشه داخلی چشم به طرف گوشه خارجی تمیز کنید.
- هنگام ریختن قطره سر را به عقب خم کرده و به سقف نگاه کنید و به آرامی پلک پایین را به طرف پایین کشیده تا یک حفره ایجاد شود و سپس یک قطره از دارو در این حفره چکانده شود.
- بعد از چکاندن قطره پلک ها را حدود سی تا چهل ثانیه بسته نگه دارید و آن را مالش ندهید و از پلک زدن شدید خودداری کنید.
- موقع چکاندن قطره مراقب باشید که قطره چکان با پلک یا چشم تماس پیدا نکند.
- در پوش قطره چکان را بلافاصله پس از مصرف ببندید.
- با پنبه مایعات بیرون ریخته از چشم را پاک کنید زیرا باعث ایجاد حساسیت در اطراف پلک می گردد.
- قطره ها را بر اساس دستور روی آنها و در موقع مقتضی دور بیندازید.
- در صورت مشاهده تغییر رنگ یا رسوب قطره از مصرف آن خودداری گردد.
- بین ریختن قطره های مختلف حداقل ۵ دقیقه صبر کنید تا اثر لازم را داشته باشد.
- اگر لازم است قطره و پماد چشمی را باهم مصرف کنید بهتر است اول قطره در چشم ریخته شود و سپس پماد را داخل چشم بگذارید.
- مصرف قطره های چشمی بر اساس دستور پزشک پس از عمل لازم است. از مصرف و یا قطع خود سرانه داروها جدا خودداری کنید.
- سعی کنید قطره ها را در زمان تعیین شده استفاده کنید اما در فواصل خواب ۶-۵ ساعت لازم نیست برای چکاندن قطره از خواب بیدار شوید. (با نظر پزشک معالج)

کد محتوا: ۲